

Bijlage 2: Referentierooster betreffende een aantal types van inzonderheid chronische ziekten waarvoor, aan de voorwaarden hierna gespecificeerd
 -hetzij geen bijpremies mogen worden aangerekend, noch in een uitsluiting mag worden voorzien of de overeenkomst mag worden geweigerd ten gevolge van deze aandoening
 -hetzij een geplafonneerde bij premie kan worden aangerekend ten gevolge van deze aandoening (art. 61/3, § 2)

Type aandoening	Nauwkeurige definitie	Wachttijd te rekenen vanaf de diagnose	Detail van de acceptatievoorwaarden en maximale bij premie toepasbaar door de verzekeraar
Infectie door het HIV-virus	<ul style="list-style-type: none"> - CD4 \geq 350/mm³ over de hele historiek ; - CD4 \geq 500/mm³ en niet-detecteerbare virale lading 12 maanden na het opstarten van de behandeling, zonder hervat gedurende 2 jaar ; - geen AIDS-stadium ; - geen huidige co-infectie door het HBV- of het HCV ; - geen eerdere co-infectie door het HCV, zonder fibrorestadium hoger dan F2; - geen coronaire hartziekte en beroerte (CVA); - geen gebruik van illegale substanties; - geen aanwezige kanker op dit ogenblik, noch tijdens de voorbije 10 jaar; - geen actief tabaksgebruik; - behandeling opgestart na januari 2005. <p>Biologisch bilan van minder dan 6 maanden met resultaten binnen de labonormen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - levertesten (transaminasen ALAT, ASAT, GGT); - nierfunctie (GFR); - nuchtere glycemie, lipidenbalans (onderzoek naar een lipiden-afwijking); - negatieve cotinine test in de urine. <p>Virale markers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - HBV-markers : Ag HBs negatief, Negatief viraal DNA; - HCV-markers : Negatief viraal RNA, de voorgaande 48 weken. 	2 jaar	<ul style="list-style-type: none"> - Overlijden: bij premie begrensd tot 100 % - Duur tussen begin behandeling en einde schuldsaldoverzeeringscontract : begrensd tot 27 jaar.

Virale hepatitis C	<p>Initiële fibrosis score lager dan of gelijk aan F2, bevestigd door ten minste 2 non-invasieve tests of na histologisch onderzoek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanhoudende virale respons ongeacht de behandeling - Geen eerdere periodes van infectie door het HCV-virus - Geen co-infectie door het HIV-virus, het hepatitis B-virus <p>Normale echografie van de lever, zonder dysmorphie noch steatose.</p>	48 weken vanaf het einde van de behandeling	Overlijden: geen bijpremie
Chronische virale hepatitis HCV Fibrosis score F3	<p>Fibrosis score bij begin van de behandeling gelijk aan F3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met volgende resultaten : <ul style="list-style-type: none"> o Fibroscan : 9,5 tot 12,5 kPa o Fibrotest : 0,59 tot 0,72 o Fibrometer : 0,72 tot 0,84 - Aanhoudende virale respons ongeacht de behandeling; - geen eerdere infectie-episodes door het HCV of hepatocellulair carcinoom (HCC); - geen co-infectie door de virussen HIV, HBV; - geen evolutie naar een cirrose; - geen residuele extrahepatische manifestatie van hepatitis C (lymfoom, gemengde cryoglobulinemie, systemische vasculitis, membraanproliferatieve glomerulonephritis, perifere neuropathieën, inflammatoire polyarthritis); - Hepatische echografie van minder dan 6 maanden zonder tekenen van steatose; - Biologisch bilan van minder dan 6 maanden : normale ASAT, ALAT en Gamma GT, aantal bloedplaatjes $\geq 150\ 000/\text{mm}^3$, PT $\geq 80\%$, albuminemie $\geq 40\text{g/l}$, Alfafoetoproteïnemie $< 10\ \text{ng/ml}$. 	48 weken vanaf het einde van de behandeling	- Overlijden: bijpremie begrensd tot 125 %
Pilocytair astrocytoom	<ul style="list-style-type: none"> - Leeftijd bij diagnose : ≥ 18 jaar en ≤ 60 jaar - Histologie : pilocytair astrocytoom enkel graad I - Behandeling : alleen chirurgie met volledige excisie van de tumor 	4 jaar na de chirurgische ingreep	- Overlijden: toegerekend zonder bijpremie
Chronische myeloïde leukemie (CML)	<ul style="list-style-type: none"> - Lopende behandeling - geen detecteerbare bcr-abl transcripten met de technieken die op het ogenblik van de onderschrijving werden toegepast, en gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden voorafgaand aan de onderschrijving, met de in die periode gevalideerde technieken 	5 jaar na de diagnose	- Overlijden : bijpremie begrensd tot 150 %
Burkitt-leukemie/Burkitt-lymfoom/ALL3	<ul style="list-style-type: none"> - leeftijd ≤ 60 jaar - Performance Status (definitie van de WGO) 0 of 1 - behandeling beëindigd 	5 naar na de diagnose	- Overlijden : bijpremie begrensd tot 50 %

Mucoviscidose	<p>1) Cumulatieve basisvoorwaarden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - leeftijd \geq 18 jaar en \leq 40 jaar - Niet getransplanteerd - Body Mass Index, BMI \geq 17 kg/m²- FEV1 \geq 25% van de theoretische waarde - geen diabetes - geen pneumothorax (klaplong) het afgelopen jaar - geen kolonisatie van Burkholderia cepacia - geen kolonisatie van atypische Mycobacteriën. - Systemische corticotherapie gedurende < (minder dan) 3 maanden het afgelopen jaar - geen zuurstoftherapie van lange duur - geen niet-invasieve beademing van lange duur <p>2) Aanvullende voorwaarden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij : geen kolonisatie van P. aeruginosa, - hetzij : kolonisatie van P. Aeruginosa maar geen exocriene pancreasinsufficiëntie 	Voor een leningsduur van maximum 10 jaar	- Overlijden met een bijpremie begrensd tot 400 %
---------------	---	--	---

Type aandoening	Referentiestadia-pretherapeutische stadia				Wachttijd te rekenen vanaf de diagnose	Detail van de acceptatievoorwaarden en maximale bijpremie
Adenocarcinoom van de prostaat in actieve bewaking	<ul style="list-style-type: none"> - leeftijd bij de diagnose : \geq 55 jaar - Klinisch stadium \leq T1c - PSA \leq 10 ng/mL - Gleason-score \leq 6 - aantal positieve biopsieën \leq 2 en % kwaadaardig weefsel per monster \leq 50 % ; Histologie : zuiver adenocarcinoom, strikt intra-glandulair - uitsluiting van elke behandeling en vooral van hormoontherapie 				Geen wachttijd	- Overlijden: bijpremie begrensd tot 75 %
Adenocarcinoom van de prostaat	Stadium	Criteria	PSA na radicale prostatectomie (dosering minder dan 6 maanden oud)	PSA na conforme radiotherapie of Curiotherapie (dosering minder dan 6 maanden oud)		
	T1N0M0 T2aN0M0	PSA < 10ng/ml en Gleason \leq 6	Minder dan 0,1 ng/ml	Minder dan 1,5 ng/ml	1 jaar	Normaal tarief
	T1N0M0 T2aN0M0	10ng/ml < PSA < 20ng/ml of Gleason = 7			5 jaar	Normaal tarief
T2bN0M0	PSA < 20ng/ml en Gleason \leq 7		5 jaar	Normaal tarief		

We herinneren eraan dat de toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde termijnen enkel gelden bij afwezigheid van andere risicofactoren of bestaande pathologieën.